

ダラキュー[®]で全身性ALアミロイドーシスを治療される方へ

DCyBorD療法※ 投与カレンダー（例）

※ダラキュー[®]+シクロホスファミド水和物+ベルケイド[®]+デキサメタゾン



DCyBorD療法は、複数のお薬と併用して行います。

医師の指示に従い、通院、服薬を行ってください。

ダラキュー [®] 投与頻度	サイクル1～2(4週間1サイクル)																												
	1週目							2週目							3週目							4週目							
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー [®] (皮下投与)	●							●							●							●							
シクロホスファミド水和物 (経口又は静脈内投与)	●							●							●							●							
ベルケイド [®] (皮下投与)	●							●							●							●							
デキサメタゾン (経口投与)	●*							●*							●*							●*							
週に1回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
ダラキュー [®] 投与頻度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
2週に1回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
4週に1回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
サイクル3～6(4週間1サイクル)																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー [®] (皮下投与)	●														●														
シクロホスファミド水和物 (経口又は静脈内投与)	●							●							●							●							
ベルケイド [®] (皮下投与)	●							●							●							●							
デキサメタゾン (経口投与)	●*							●*							●*							●*							
サイクル7以降(4週間1サイクル)																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー [®] (皮下投与)	●																												

サイクル7以降、最長24サイクルまでサイクル7のスケジュールを繰り返し

サイクル7以降、治療のための薬としてはシクロホスファミド水和物とベルケイド[®]、デキサメタゾンは投与されないため、表中割愛しています。

※分割して2日にわたる投与も可能です。

● ● 投与日 ■ 来院必須日

この投与カレンダーは一例です。
医師の指示に従い、通院、服薬を行ってください。

ヤンセンファーマ株式会社

Johnson&Johnson

©Janssen Pharmaceutical K.K. 2025

2025年12月作成