

# 【以前に多発性骨髓腫の治療を受けたが、効果がみられなかつたまたは治療後に再発した患者さん】 DCd療法(ダラキュー<sup>ロ</sup>®+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン)投与カレンダー(例)

- DCd療法を受ける場合、28日(4週間)ごとのサイクルで治療します。
- 最初の2サイクルの1～3週目は週に2回、4週目は週に1回、サイクル3以降の1～3週目は週に2回の来院が必須です。  
治療が進むにつれ、ダラキュー<sup>ロ</sup>®の投与間隔は長くなります。

ダラキュー<sup>ロ</sup>®  
投与頻度

週に1回

1～2サイクル (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー <sup>ロ</sup> ®(皮下注射)	●							●							●							●							
カルフィルゾミブ(点滴)*	●	●						●	●						●	●													
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●	●						●	●						●	●							●						

2週に1回

3～6サイクル (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー <sup>ロ</sup> ®(皮下注射)	●														●														
カルフィルゾミブ(点滴)	●	●						●	●						●	●													
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●	●						●	●						●	●								●					

4週に1回

7サイクル以降 (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー <sup>ロ</sup> ®(皮下注射)	●																												
カルフィルゾミブ(点滴)	●	●						●	●						●	●													
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●	●						●	●						●	●								●					

□：来院必須日

\*カルフィルゾミブは、1サイクルの1、2日目とそれ以降の投与日で投与量が異なります。デキサメタゾンは投与日や、患者さんの年齢・状態によって、投与量が異なります。

- ・来院必須日以外でも3サイクル以降の22日目はデキサメタゾンを服用します。
- ・DCd療法を開始した直後は、状態を観察するため入院が必要になる場合があります。
- ・この投与カレンダーは治療の一例です。医師の指示に従い通院、服用を行ってください。

ヤンセンファーマ株式会社

Johnson&Johnson