

【初めて多発性骨髄腫の治療を受ける患者さん】

DLd療法(ダラキュー^ロ®+レナリドミド+デキサメタゾン)投与カレンダー(例)

- DLd療法を受ける場合、28日(4週間)ごとのサイクルで治療します。
- 最初の2サイクルは週に1回、3~6サイクルは2週に1回、7サイクル以降は4週に1回の来院が必須です。治療が進むにつれ、ダラキュー^ロ®の投与間隔は長くなります。

ダラキュー^ロ®
投与頻度

週に1回

1~2サイクル (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー ^ロ ®(皮下注射)	●							●							●							●							
レナリドミド(内服薬)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●							●								●							●						

2週に1回

3~6サイクル (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー ^ロ ®(皮下注射)	●															●													
レナリドミド(内服薬)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●							●								●							●						

4週に1回

7サイクル以降 (4週間1サイクル)		1週目							2週目							3週目							4週目						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキュー ^ロ ®(皮下注射)	●																												
レナリドミド(内服薬)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●							●								●							●						

□ : 来院必須日

- ・来院必須日以外でも、各サイクルの1~21日目は、レナリドミドを服用します。また、デキサメタゾンも決まった日に決まった量を服用します。(点滴で投与することもあります。)
- ・DLd療法を開始した直後は、状態を観察するため入院が必要になる場合があります。
- ・この投与カレンダーは治療の一例です。医師の指示に従い通院、服用を行ってください。

ヤンセンファーマ株式会社

Johnson&Johnson