

# 【初めて多発性骨髄腫の治療を受ける患者さん】

## DMPB療法(ダラキьюロ<sup>®</sup>+メルファラン+プレドニゾロン+ボルテゾミブ)投与カレンダー(例)

- DMPB療法を受ける場合、42日(6週間)ごとのサイクルを9サイクル実施した後、28日(4週間)ごとのサイクルで治療します。
- 最初の1サイクルは1、2、4、5週目は週に2回、3、6週目は週に1回、2~9サイクルは1、2、4、5週目は週に1回(3、6週目は必須の来院なし)、10サイクル以降は4週に1回の来院が必須です。治療が進むにつれ、ダラキьюロ<sup>®</sup>の投与間隔は長くなります。

ダラキьюロ<sup>®</sup>  
投与頻度

週に1回

1サイクル (6週間1サイクル)		1週目				2週目				3週目				4週目				5週目				6週目																						
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
ダラキьюロ <sup>®</sup> (皮下注射)		●							●							●							●							●					●									
ボルテゾミブ(皮下または静脈内注射)		●				●			●			●											●			●				●					●									
メルファラン(内服薬)		●	●	●	●																																							
プレドニゾロン(内服薬)		●	●	●	●																																							

3週に1回

2~9サイクル (6週間1サイクル)		1週目				2週目				3週目				4週目				5週目				6週目																								
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
ダラキьюロ <sup>®</sup> (皮下注射)		●																					●																							
ボルテゾミブ(皮下または静脈内注射)		●								●													●								●															
メルファラン(内服薬)		●	●	●	●																																									
プレドニゾロン(内服薬)		●	●	●	●																																									

4週に1回

10サイクル以降 (4週間1サイクル)		1週目				2週目				3週目				4週目																																
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																	
ダラキьюロ <sup>®</sup> (皮下注射)		●																																												

□ : 来院必須日

- 来院必須日以外でも、1~9サイクルの1~4日目はメルファラン、プレドニゾロンを服用します。
- DMPB療法を開始した直後は、状態を観察するため入院が必要になる場合があります。
- 前投与としてデキサメタゾンを投与する場合があります。医師の指示に従って服薬を行ってください。
- この投与カレンダーは治療の一例です。医師の指示に従い通院、服用を行ってください。

ヤンセンファーマ株式会社

Johnson&Johnson