

## 【以前に多発性骨髄腫の治療を受けたが、効果がみられなかつたまたは治療後に再発した患者さん】

### DBd療法(ダラザレックス®+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)投与カレンダー(例)

- DBd療法を受ける場合、21日(3週間)ごとのサイクルを8サイクル実施した後、28日(4週間)ごとのサイクルで治療します。
- 最初の3サイクルの1、2週目は週に2日、3週目は週に1日、サイクル4~8の1、2週目は週に2日(3週目は必須の来院なし)、サイクル9以降は4週に1日の来院が必須です。治療が進むにつれ、ダラザレックス®の投与間隔は長くなります。
- 1サイクル、1週目のダラザレックス®投与は、1日目と2日目に分割して投与されることもあります。

ダラザレックス®  
投与頻度

週に1日

サイクル1~3 (3週間1サイクル)			1週目				2週目				3週目										
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ダラザレックス®(点滴)	●							●													
ボルテゾミブ(皮下または静脈内注射)	●			●				●			●										
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●	●		●	●			●	●		●	●									

3週に1日

サイクル4~8 (3週間1サイクル)			1週目				2週目				3週目										
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ダラザレックス®(点滴)	●																				
ボルテゾミブ(皮下または静脈内注射)	●			●				●			●										
デキサメタゾン(内服薬または点滴)	●	●		●	●			●	●		●	●									

4週に1日

サイクル9以降 (4週間1サイクル)			1週目				2週目				3週目				4週目													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラザレックス®(点滴)	●																											

□ : 来院必須日

- ・来院必須日以外でも、ボルテゾミブを投与された翌日はデキサメタゾンを服用します。(点滴で投与することもあります。)
- ・DBd療法を開始した直後は、状態を観察するため入院が必要になる場合があります。
- ・この投与カレンダーは治療の一例です。医師の指示に従い通院、服薬を行ってください。

ヤンセンファーマ株式会社

Johnson&amp;Johnson